



Bulletin de Santé du Végétal

Nouvelle-Aquitaine



Vigne

N°17
22/07/2025



Animateur filière

Magdalena GIRARD
Chambre d'agriculture de la
Charente-Maritime
magdalena.girard@charente-
maritime.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES
Site de Bordeaux

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Vigne /
Edition Charentes
N°16 du 16/07/2025 »



Edition Charentes

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [Formulaire d'abonnement au BSV](#)

Consultez les **événements agro-écologiques** près de chez vous !

Ce qu'il faut retenir

Phénologie

- **Stade moyen (Ugni blanc) : 33 – fermeture de la grappe**

Mildiou

- **Risque toujours faible à très faible**
- **Faibles contaminations annoncées**

Black rot

- **Risque théorique toujours très fort**
- **Contaminations possibles sur les pluies à venir**

Oïdium

- **Risque fort, mais en baisse**
- **Propagation possible de proche en proche dans les parcelles atteintes**

Tordeuses

- **Deuxième vol d'Eudémis toujours en cours, intensité faible**

Cicadelles vertes

- **Premier comptage des larves la semaine prochaine**

Le bulletin de cette semaine est réalisé à partir des premières données d'observations du réseau de parcelles, complétées par des données « tour de plaine ».

La qualité des données du BSV dépend, en grande partie, de la qualité et de la taille du réseau d'observations du vignoble Charentais. Participez, vous aussi, tout au long de la saison à l'amélioration du réseau d'observations du BSV en multipliant vos signalements (maladies, ravageurs, événements climatiques...) sur le site [Web Alerte Vigne](#).




Stade 32.8 – fermeture quasi atteinte



Début véraison, Cabernet Sauvignon, Ile de Ré

Peu d'évolution depuis la semaine dernière : les rameaux ne poussent plus et les grappes évoluent lentement.
Sur 37 parcelles d'Ugni blanc observées, le stade moyen calculé est de 32.8 (BBCH 77 - fermeture).
Le stade fermeture peine à se généraliser, les pluies de ces derniers jours vont peut-être permettre aux baies de mieux se développer.

Climatologie



Climatologie des quatre dernières semaines

→ De la semaine passée

Températures

Les températures moyennes de la semaine passée atteignent 21.4°C.

Pluies

Au cours de la dernière semaine, la moyenne hebdomadaire des précipitations sur l'ensemble du vignoble est de 28.6 mm. Le zonage montre les résultats suivants : Sud 15.3 mm ; Littoral 32.2 mm ; Cœur 32.3 mm ; Iles 31.7 mm ; Nord 34.4 mm ; Est 19.2 mm et Ouest 31.9 mm (période du 15/07 au 21/07).

→ Prévisions météo

Du 22/07 au 28/07, la prévision météorologique la plus probable annonce un cumul de 4.3 mm de pluie en moyenne. L'hypothèse la plus pessimiste annonce un cumul de 16.8 mm de pluie. L'épisode pluvieux le plus important aura lieu le 23/07 avec un cumul pouvant aller de 2.9 mm à 9.1 mm en moyenne sur le vignoble. Les températures maximales vont augmenter de 25 °C à 29 °C et les minimales vont rester stables autour de 15°C.

Maladies

→ Mildiou



Mildiou sur feuilles, TNT Burie
(Crédit photo S. Lucas – CIA 1779)

Observations

Sur l'ensemble des 47 Témoins Non Traités suivis cette semaine, quelques évolutions ponctuelles ont été notées. De nouvelles taches d'huile sont apparues à Bréville, Foussignac et Montguyon, ainsi que des débuts de symptômes de mildiou mosaïque à Saint Simon de Pellouaille et Montguyon. Des taches sur entre-cœurs ont également été observées à Burie et du rot brun à Floirac.

Aucun nouveau symptôme n'a été signalé dans les parcelles de référence observées cette semaine, hormis quelques rares nouvelles taches à La Couronne, Coux et Barbezieux.

Modélisation (source IFV)

Sur la semaine passée

La semaine dernière, les conditions climatiques sont restées globalement défavorables au mildiou à l'exception de quelques zones délimitées (cf. cartographie).


Le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, de manière généralisée dans le vignoble.

Dans les trois jours à venir

Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, de manière généralisée dans le vignoble sur les pluies des tout prochains jours.

Dans les sept jours à venir

Dans la semaine, les conditions climatiques seront globalement défavorables au mildiou à l'exception de quelques zones délimitées (cf. cartographie).



Evaluation du risque :

Niveau de risque théorique très localement en hausse. Quelques faibles contaminations possibles sur les pluies à venir.



Risque majoritairement faible à très faible

 Consultez la fiche « [mildiou](#) » du Guide de l'Observateur

→ Black rot

Observations

Concernant le black rot, la dynamique reste globalement inchangée cette semaine. Quelques évolutions localisées sont toutefois à noter. De nouveaux symptômes sur feuilles ont été observés sur le Témoin Non Traité de Brizambourg et sur feuilles et grappes à Chadenac. Aucune évolution n'est relevée dans les parcelles de référence.

Modélisation

Sur la semaine passée

Au cours de la semaine dernière, les conditions climatiques ont été très favorables à la maturation des périthèces.

Le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité forte à très forte, de manière généralisée dans le vignoble (+23.8 % de FTA en moyenne sur le vignoble).

Dans les sept jours à venir

Les conditions climatiques vont rester très favorables à la maturation des périthèces. Le risque potentiel sera très fort sur l'ensemble du vignoble.

Selon l'hypothèse météorologique la plus probable, le modèle calcule des contaminations épidémiques, d'intensité faible à modérée, localement dans le vignoble.

Dans le cas de l'hypothèse météorologique la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques, d'intensité faible à modérée, de manière généralisée dans le vignoble.

 Consultez la fiche « [black rot](#) » du Guide de l'Observateur

Evaluation du risque :

Sensibilité des grappes en baisse. Risque potentiel très fort sur tous les secteurs. Contaminations faibles à modérées prévues sur toute pluie à venir.



Risque théorique très fort

N.B. Les fortes attaques de black rot sont en général limitées aux parcelles à historique. Un niveau de risque très fort et l'annonce de contaminations ne présagent pas d'une explosion généralisée au niveau du vignoble.

→ Oïdium

Observations

Sur les 47 Témoins Non Traités observés cette semaine, sept ne présentent toujours aucun symptôme. Dans les parcelles déjà touchées, une progression sur grappes est notée par rapport à la semaine précédente, avec en moyenne 32 % des grappes atteintes pour une intensité moyenne de 11 %.

Dans les parcelles de référence, de nouveaux foyers ont été signalés à Brie-sous-Archiac, Malaville, Salles-d'Angles, Touzac, Sigogne, Bonneuil et Champagne-Vigny. Une évolution plus marquée est observée à Angeac-Champagne, Juillac-le-Coq, Pouillac et Barbezieux, avec des atteintes à la fois sur feuilles et sur grappes. Toutefois, l'ensemble des symptômes observés reste, à ce stade, de faible intensité.

Modélisation

Sur la semaine passée


Au cours de la semaine dernière, les conditions climatiques ont été favorables à l'oïdium sur l'ensemble du vignoble, voire très favorables (cf. cartographie).

Le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, de manière généralisée dans le vignoble.

Dans les sept jours à venir

Les conditions climatiques resteront favorables à l'oïdium sur l'ensemble du vignoble, voire très favorables (cf. cartographie).

Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, de manière régulière dans le vignoble.



Evaluation du risque :

Fin de sensibilité des grappes aux nouvelles contaminations. Propagation de proche en proche possible, ainsi que des contaminations sur jeunes feuilles. Niveau de risque en légère baisse, fort à très fort sur l'ensemble du vignoble.



▲ **Risque théorique fort, très faibles contaminations prévues en cas de pluies**



Grappe de Chardonnay totalement envahie par l'oïdium, Ile de Ré, et oïdium sur baies, TNT Claix
(Crédits photos J. Poulard - UNIRE, F. Joseph - Ets Niort Agricole)

📖 **Consultez la fiche « [oïdium](#) » du Guide de l'Observateur**


Ravageurs

→ Tordeuses

Observations

Eudémis

Sur la semaine le vol reste de faible intensité en piégeage sexuel, excepté quelques papillons à Brizamboug et un pic de captures à Jurignac. Sur le secteur de Jurignac, le piégeage alimentaire semble par ailleurs indiquer un regain d'activité le week-end dernier. Seule l'observation attentive des grappes (recherche des pontes et des premières perforations des jeunes larves) permet de déterminer la nécessité d'intervenir ou non.




Si vous observez des perforations de tordeuses au vignoble, merci de nous le signaler :
magdalena.girard@cmds.chambagri.fr ou laurent.duquesne@charente.chambagri.fr

Consultez la [fiche technique Vers de la grappe](#) qui présente les différents types de piégeage.

→ Cicadelles vertes

Observations



L'intensité des captures dans les pièges chromatiques a nettement diminué sur la semaine écoulée. A compter de la semaine prochaine il est conseillé de surveiller l'évolution des populations larvaires à la face inférieure des feuilles.

→ Focus auxiliaires Les Chrysopes



Chrysope adulte et œuf de Chrysope

Appartenant à la famille des Chrysopidés, les chrysopes (160 espèces) ont de grandes ressemblances morphologiques avec les hémérobés. Les chrysopes adultes sont reconnaissables par leurs 4 ailes longues et nervurées, leur couleur verte, leurs longues antennes et leurs abdomens allongés. L'espèce la plus connue est *Chrysoperla carnea*, décrite pour la première fois en 1836. On les retrouve essentiellement dans les cultures maraîchères (aubergines, poivrons, etc..) et fruitières.

Cycle biologique

Le développement des chrysopes est fortement influencé par la température. Le développement de l'œuf à l'adulte dure environ 70 jours alors que la durée de vie de cet insecte peut atteindre jusqu'à 2 mois.

Rôle(s) d'auxiliaire

Ce sont les larves de chrysopes qui ont une activité prédatrice. La larve de *Chrysoperla carnea* est notamment prédatrice de pucerons. Une larve peut consommer jusqu'à **400 pucerons** durant leur développement. C'est au cours du dernier stade larvaire que la consommation de pucerons est la plus importante.

Note calendrier : Principalement actives de mai à septembre.

Plus d'informations sur la page Ephytia INRAe dédiée :

<https://ephytia.inra.fr/fr/C/19932/Biocontrol-Chrysoperla-carnea>

Le Mémo de l'Observateur

A faire :

- Observations phénologie croissance
- Observation des témoins non traités et parcelles de référence
- Relevés des pièges sexuels
- Relevés des pièges chromatiques
- Premier comptage des larves de cicadelles la semaine prochaine

Retrouvez le Guide de l'Observateur en [cliquant ici](#)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Charentes sont les suivantes : les Chambres d'Agriculture de la Charente et de la Charente Maritime/Deux Sèvres, la Coopérative Agricole d'Achats en Commun et d'Approvisionnement, la Coopérative Agricole de la Région de Cognac, la Coopérative Agricole Terre Atlantique, le Groupe Coopératif Océalia, la Coopérative Agricole du canton de Matha, la Coopérative des Vignerons de l'Île de Ré, Rémy Martin, Martell, Hennessy, Domaines Boinaud, Vitivista, le Groupe Isidore, les Ets Fortet-Dufaud, les Ets Soufflet Agriculture, les Ets Landreau et Fils, les Ets Piveteau, les Ets Niort Agricole, les Ets Etourneaud, les Ets Nau, la FDCETA, la FREDON Nouvelle Aquitaine, l'Institut Français de la Vigne et du Vin, la Station Viticole du BNIC et les Établissements d'enseignement agricole de Saintes, Jonzac et l'Oisellerie.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

« Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité ».