



Vigne

Edition Charentes

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT** en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

N°16
15/07/2026



Animateur filière

Magdalena GIRARD
Chambre
Interdépartementale
d'agriculture Charente-
Maritime Deux-Sèvres
magdalena.girard@cmds.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie
écophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Vigne /
Edition Charentes
N°16 du 15/07/2026 »

Ce qu'il faut retenir

Phénologie

- Stade moyen (Ugni blanc) : 32.9 – fermeture de la grappe

Mildiou

- Pas d'évolution
- Très faibles contaminations possibles localement

Black rot

- Pas d'évolution
- Contaminations possibles localement

Oïdium

- Légère progression dans quelques TNT
- Risque de très faibles contaminations localisées

Tordeuses

- Deuxième vol d'Eudémis toujours en cours, intensité faible

Cicadelle verte

- Début de suivi des larves semaine prochaine

Flavescence dorée

- Troisième traitement entre le 13 juillet et le 16 août

Le bulletin de cette semaine est réalisé à partir des premières données d'observations du réseau de parcelles, complétées par des données « tour de plaine ».

La qualité des données du BSV dépend, en grande partie, de la qualité et de la taille du réseau d'observations du vignoble Charentais. Participez, vous aussi, tout au long de la saison à l'amélioration du réseau d'observations du BSV en multipliant vos signalements (maladies, ravageurs, événements climatiques...) sur le site [Web Alerte Vigne](#)



Phénologie

Très peu d'évolution depuis la semaine dernière, le stade moyen calculé sur 16 parcelles observées est de 32.9 - Fermeture - BBCH 77.

Suite aux fortes chaleurs et à la sécheresse de ces derniers jours, la croissance des baies est fortement ralentie, elles ne grossissent plus.

Les toutes premières baies vérées sont signalées sur une parcelle d'Ugni blanc (Mortagne sur Gironde).




Stade 32.9 – fermeture de la grappe



Premières baies vérées, Merlot Ile de Ré

Climatologie

→ De la semaine passée



Températures

Les températures moyennes de la semaine augmentent fortement et atteignent 28.8°C.

Pluies

Au cours de la dernière semaine, la moyenne hebdomadaire des précipitations sur l'ensemble des vignobles est de 3.3 mm. Le zonage montre les résultats suivants : Cognac-Centre 4.3 mm, Cognac-Est 2.8 mm, Cognac-Nord 1.6 mm, Cognac-Ouest 2.8 mm, Cognac-Sud 9.6 mm, Iles-Charente-Maritime 0.4 mm, Littoral-Charente-Maritime 1.2 mm (période du 08/07 au 14/07).

Prévisions météo

Du 15/07 au 21/07, la prévision météorologique la plus probable annonce un cumul de 3.5 mm. L'hypothèse la plus pessimiste annonce un cumul de 13.3 mm de pluie. Les températures maximales vont diminuer de 35 à 29°C en fin de semaine puis augmenter autour de 33°C et les minimales seront stables autour de 20°C.



Grêle

Des orages accompagnés de grêle ont localement eu lieu ce matin dans le vignoble. Plusieurs secteurs différents sont concernés, notamment St Bonnet sur Gironde, Mirambeau, Barbezieux, Epargnes, Salles d'Angles, Genté, St Denis d'Oléron, Montendre, Chantillac, Chaniers, St Cesaïre, La Chapelle des Pots, Echebrune, Lonzac, Celles, Fléac, St Saturnin, St Simeux, Moulidars, Boisredon, Jarnac Champagne... Il est difficile pour le moment d'évaluer l'ampleur des dégâts.



Dégâts de grêle, Boisredon, Moulidars, St Simeux, St Bris des Bois

(Crédits photos L. Bizeau – CIA 1779, M. Bourgoïn – Moulidars, B. Hirondeau – CA16, A. Janot - Bercloux)



Maladies

→ Mildiou

Observations

Les conditions climatiques de la semaine ont maintenu une situation stable vis-à-vis du mildiou. Aucune évolution des symptômes n'a été constatée lors des observations effectuées sur les témoins non traités et les parcelles de référence.

Modélisation (source IFV)

Sur la semaine passée


La semaine dernière, le risque potentiel est resté faible à très faible sur l'ensemble du vignoble (cf. cartographie).

Au cours des sept derniers jours, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, très localement dans le vignoble, 13% des points de modélisation ont connu une hausse de leur Fréquence Théorique d'Attaque (FTA).

Dans les sept jours à venir

Au cours de la semaine, le risque sera très faible sur l'ensemble du vignoble, les conditions seront défavorables au mildiou (Cf. cartographie).

Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques d'intensité très faible, localement dans le vignoble



Evaluation du risque :

Pas d'évolution. Niveau de risque majoritairement toujours très faible.



Très faibles contaminations possibles localement

 Consultez la fiche « [mildiou](#) » du Guide de l'Observateur



→ Black rot

Observations

Dans les témoins non traités et les parcelles de référence la situation est demeurée inchangée ces derniers jours.

Modélisation

Sur la semaine passée

D'après le modèle, au cours de la semaine dernière, le risque potentiel est resté très fort.

Au cours des sept derniers jours, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité modérée à forte, localement dans le vignoble, 36% des points de modélisation ont connu une hausse de leur Fréquence Théorique d'Attaque (FTA).

Dans les sept jours à venir

Dans les jours à venir, le risque potentiel restera très fort.

Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques, d'intensité modérée, localement dans le vignoble.

Risque potentiel : indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations.

Evaluation du risque :

Risque théorique toujours très fort.



Contaminations possibles localement

 Consultez la fiche « [black rot](#) » du Guide de l'Observateur

→ Oïdium

Observations

Une évolution de l'oïdium est observée localement dans 7 témoins non traités. Elle est plus marquée à Arthenac, avec une hausse de 25 points de la fréquence des feuilles touchées. Quelques grappes présentent désormais des symptômes. Dans les autres témoins concernés, la progression demeure modérée.

Dans les parcelles de référence, seule celle de Pouillac enregistre une légère évolution.

Modélisation


Sur la semaine passée

Au cours de la semaine dernière, le risque potentiel est resté fort à très fort, les conditions sont restées favorables à l'oïdium (Cf. cartographie).

Au cours des sept derniers jours, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, localement dans le vignoble, 20% des points de modélisation ont connu une hausse de leur Fréquence Théorique d'Attaque (FTA).

Dans les sept jours à venir

Dans les jours à venir, le risque potentiel restera fort à très fort. Les conditions seront très favorables à l'oïdium. Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, localement dans le vignoble.



Attention, le modèle ne tient pas compte de l'hygrométrie et de l'humectation, mais uniquement de la pluviométrie.

Risque potentiel : indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations.

Evaluation du risque :

Niveau de risque théorique fort à très fort



Très faibles contaminations possibles localement


 Consultez la fiche « [oïdium](#) » du Guide de l'Observateur

Ravageurs

→ Tordeuses

Observations

Cette semaine, 110 captures d'Eudémis ont été enregistrées dans les deux Charentes. Des captures ont été observées à Ars (51), Arthenac (4), Burie (1), Echallat (5), Écoyeux (9), Guimps (7), Jurignac (5), Les Métaïries (6), Lignières-Sonneville (1), Pouillac (4), Vénérand (17).



Modèle Activ

A ce jour, le modèle indique l'émergence de 10 à 40% des papillons d'eudémis. Au cours de la semaine dernière, le modèle a indiqué la présence des premiers œufs âgés.

Dans les sept jours à venir

Le modèle indique l'émergence de 30 à 70% des papillons d'eudémis cette semaine. Le modèle indique les premières éclosions cette semaine.



→ Cicadelles vertes

Observations


Cette semaine, 147 nouvelles captures ont été réalisées dans le vignoble, soit une moyenne de 2.3 captures par piège observé.

Malgré une légère augmentation des captures par rapport à la semaine passée, la dynamique du vol tend à diminuer. Le pic de captures a été enregistré en semaine 25, entre le 16 et le 23 juin.

Information observations

À partir de la semaine prochaine, vous devez suivre l'évolution des populations larvaires en observant la face inférieure des feuilles. Pour rappel, les larves de cicadelles vertes sont facilement reconnaissables par leur mode de déplacement en « crabe ».

Le comptage devra être fait sur les feuilles âgées situées au niveau des grappes, en les retournant délicatement. Comptabiliser toutes les larves observées.



Seuil de nuisibilité

Le seuil de nuisibilité est de 100 larves pour 100 feuilles.



Larve de cicadelle verte



Le Mémo de l'Observateur

A faire :

- Observations phénologie/croissance.
- Recherche des symptômes de mildiou/oïdium/black rot
- Relevés des pièges chromatiques cicadelle verte
- **Premiers comptages de larves de cicadelle verte**
- Relevés des pièges sexuels et alimentaires

Retrouvez le Guide de l'Observateur en [cliquant ici](#)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Charentes sont les suivantes : les Chambres d'Agriculture de la Charente et de la Charente Maritime/Deux Sèvres, la Coopérative Agricole de la Région de Cognac, la Coopérative Agricole Terre Atlantique, le Groupe Coopératif Océalia, la Coopérative Agricole du canton de Matha, la Coopérative des Vignerons de l'Île de Ré, la Coopérative d'Orignolles, Rémy Martin, Martell, Hennessy, Domaines Boinaud, Courvoisier, Vitivista, le Groupe Isidore, les Ets Fortet-Dufaud, les Ets Soufflet Agriculture, les Ets Landreau et Fils, les Ets Piveteau, les Ets Niort Agricole, les Ets Etourneauud, les Ets Nau, la FDCETA, la FREDON Nouvelle Aquitaine, l'Institut Français de la Vigne et du Vin, la Station Viticole du BNIC et les Établissements d'enseignement agricole de Saintes, Jonzac et l'Oisellerie, Viticulteurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

